

場の量子論 p247check9.6

谷脇 貞善

2024年7月5日

1 本文

$$\Phi' = e^{-i\theta}\Phi \quad (1)$$

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + i\phi_2) \quad (2)$$

$$\Phi' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi'_1 + i\phi'_2) \quad (3)$$

$$\phi'_1 + i\phi'_2 = (\cos\theta - i\sin\theta)(\phi_1 + i\phi_2) \quad (4)$$

$$= \phi_1 \cos\theta + \phi_2 \sin\theta + i(-\phi_1 \sin\theta + \phi_2 \cos\theta) \quad (5)$$

$$\begin{pmatrix} \phi'_1 \\ \phi'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_1 \cos\theta + \phi_2 \sin\theta \\ -\phi_1 \sin\theta + \phi_2 \cos\theta \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} \quad (7)$$

参考文献

- [1] 坂本真人著「場の量子論-不变性と自由場を中心にして」(裳華房,2014,ISBN9784785325114)